

ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОЛОНОСКОПИИ (один на выбор врачом) - подробная схема разведения и приема препарата указана в инструкции:

ЭЗИКЛЕН:

Содержимое одного флакона препарата Эзиклен следует вылить в мерный стакан и развести водой 0.5л.

Если исследование до 13:00 одноэтапная вечерняя:

18:00 - 19:00 Прием первой дозы раствора препарата Эзиклен

19:00 - 20:00 Прием разрешенной жидкости (около 1 л. Если получается пить больше, чем 1 литр, то это приветствуется).

22:00 - 23:00 Прием второй дозы раствора препарата Эзиклен, в которую необходимо добавить пеногаситель – 1/2 флакона эмульсии Симетикона (сироп, т.е. жидкая форма! Не таблетки и не капсулы!), Эспумизана, Боботика, или Сабсимплекса,

23:00 - 00:00 Прием разрешенной жидкости (около 1 л. Если получается пить больше, чем 1 литр, то это приветствуется).

Если исследование после 13:00 двухэтапная схема:

День накануне исследования:

20:00 - 21:00 Прием первой дозы раствора препарата Эзиклен,

21:00 - 22:00 прием разрешенной жидкости (около 1 л. Если получается пить больше, чем 1 литр, то это приветствуется).

День исследования:

05:00 - 06:00 Прием второй дозы раствора препарата Эзиклен, в которую добавить пеногаситель – 1/2 флакона эмульсии Симетикона (сироп, т.е. жидкая форма! Не таблетки и не капсулы!), Эспумизана, Боботика, или Сабсимплекса,.

06:00 - 07:00 прием разрешенной жидкости (около 1 л. Если получается пить больше, чем 1 литр, то это приветствуется).

ФОРТРАНС:

Если исследование до 13:00:

Накануне исследования последний прием пищи должен быть не позднее 14:00.

Прием приготовленного раствора нужно начать накануне исследования с 15 до 16 часов выпивается первый литр раствора (250 мл. в течение 15 минут), с 16 до 17 часов – второй литр, с 17 до 18 часов – третий литр, с 19 до 20 часов 4ый литр, в который добавить пеногаситель – 1/2 флакона эмульсии Симетикона (сироп, т.е. жидкая форма! Не таблетки и не капсулы!), Эспумизана, Боботика, или Сабсимплекса, .

Дневное назначение колоноскопии (после 13:00)

За день до исследования легкий ужин не позднее 17:00.

Накануне исследования с 19 до 20 часов выпивается первый литр раствора (250 мл. в течение 15 минут), с 20 до 21 часов – второй литр.

В день исследования с 6 до 7 часов выпивается третий литр, с 7 до 8 часов четвертый литр раствора, в который добавить пеногаситель – 1/2 флакона эмульсии Симетикона (сироп, т.е. жидкая форма! Не таблетки и не капсулы!), Эспумизана, Боботика, или Сабсимплекса, .

ПИКОПРЕП:

Если процедура назначена на первую половину дня (8.00-14.00): Содержимое первого пакетика принимают после обеда или ранним вечером (16 – 18 часов), запивая не менее 5 стаканами по 250 мл воды или прозрачной жидкости (вода, негазированные безалкогольные напитки, чай, кофе, фруктовый сок без мякоти).

Содержимое второго пакетика принимают на ночь (22 - 24 часов), запивая не менее 3 стаканами по 250 мл воды или прозрачной жидкости - в первый стакан добавить пеногаситель – 1/2 флакона эмульсии Симетикона (сироп, т.е. жидкая форма! Не таблетки и не капсулы!), Эспумизана, Боботика, или Сабсимплекса, . Последний стакан можно выпить не позднее, чем за 1 час до процедуры.

Если процедура назначена на вторую половину дня (14.00-20.00):

Содержимое первого пакетика принимают вечером (в 17 – 21 часов) в день, предшествующий процедуре, запивая не менее 5 стаканами по 250 мл воды или прозрачной жидкости.

Содержимое второго пакетика принимают утром (за 5 - 9 часов до процедуры), запивая не менее 3 стаканами по 250 мл воды или прозрачной жидкости - в первый стакан добавить пеногаситель – 1/2 флакона эмульсии Симетикона (сироп, т.е. жидкая форма! Не таблетки и не капсулы!), Эспумизана, Боботика, или Сабсимплекса, . Последний стакан можно выпить не позднее, чем за 1 час до процедуры.